

# Určování v přírodě

Ilustrace: Jan HOŠEK

Strakapoudi  
s černým hřbetem  
a bílými skvrnami

Čeho si všimnout:

- kresba na hlavě
- barva tělní spodiny (dolní část břicha a spodní ocasní krovky)
- kresba zad a křídel nápadná především v letu

chybí  
červená

F (samice)

červený týl

M (samec)

u obou pohlaví  
červené temeno

Juv. (mládě)

červené temeno a bílá hlava  
(stejně tak samice a mláďata obou pohlaví)

uzdička plynule  
přechází na šíji

## Strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius*)

velikost: 20–22 cm

prostředí: listnaté lesy, především  
doubavy, lužní lesy

výskyt v ČR: stálý, nížiny a pahorkatiny  
zřídka nad 500 m n.m., Křivoklátsko,  
Třeboňsko, jižní Morava (Pálava, soutok řek  
Moravy a Dyje)

stav a početnost v ČR: vzrůstající,  
3500–7000 párů

M (samec)

tmavě žíhané boky

červená spodní  
část břicha  
a spodní  
krovky ocasní

růžová spodní část  
břicha a spodní krovky  
ocasní přechází na břiše  
do žlutobílé

## Strakapoud velký (*Dendrocopos major*)

velikost: 23–26 cm

prostředí: všechny typy lesa, městské parky,  
zahrady

výskyt v ČR: stálý, pravidelně hnízdí na celém  
území do 1200 m n.m.

stav a početnost v ČR: stabilní,  
200 000–400 000 párů

pozn.: náš nejhornější a největší strakapoud

červený týl (mláďata obou  
pohlaví červené temeno)

## Strakapoud jižní (*Dendrocopos syriacus*)

velikost: 23–25 cm

prostředí: sady, zahrady, stromové aleje, parky  
výskyt v ČR: stálý, od 50. let 20. stol. pravidelně hnízdí  
ve východní části rep. (západní hranice rozšíření)  
do 700 m n.m., Pálava

stav a početnost v ČR: vzrůstající, 1000–1400 párů

bílá nepřerušená  
z lící na strany krku

M (samec)

jemně  
žíhané  
boky

světle červená  
spodina břicha  
a spodní krovky  
ocasní

bílé skvrny  
na ramenou  
(krovky křídelní)

černý hřbet

Dospělé samice všech druhů:

- černobílá hlava bez červené barvy
- pouze strakapoud prostřední: červená čepička

# Strakapoudi s bílým hřbetem beze skvrn



červené temeno

## Strakapoud bělohřbetý (*Dendrocopos leucotos*)

velikost: 25–28 cm  
prostředí: staré bučiny, smíšené pralesovité porosty s trouchnivějším dřevem  
výskyt v ČR: stálý, hnízdí místy ve vyšších polohách, Šumava, Beskydy  
stav a početnost v ČR: stabilní, 150–250 párů



žluté temeno  
(stejně tak mláďata obou pohlaví)

M (samec)

bílá šije a hřbet

žíhané boky



## Strakapoud malý (*Dendrocopos minor*)

velikost: 14–16,5 cm  
prostředí: řídké listnaté lesy, lužní lesy, sady, parky, zahrady  
výskyt v ČR: stálý, řídké v nižších polohách celé republiky  
stav a početnost v ČR: vzrůstající, 3000–6000 párů  
pozn.: náš nejmenší strakapoud velikosti vrabce, pohybuje se i po pevných bylinách

## Datlík tříprstý (*Picoides tridactylus*)

velikost: 21,5–24 cm  
prostředí: horské jehličnaté lesy, staré smrčiny  
výskyt v ČR: stálý, hnízdí místy v horských oblastech mezi 800–1400 m n.m., Šumava, Beskydy  
stav a početnost v ČR: stabilní, 300–500 párů  
pozn.: na noze chybí 1 zadní prst (palec)

### Kresba na hlavě mláďat:

- s. bělohřbetý a malý – odlišená pohlaví jako u dospělých
- datlík a s. prostřední – obě pohlaví jako dospělí samci
- s. velký a jižní – obě pohlaví větší rozsah červené než dospělí samci

LITERATURA  
Velikosti: Svensson a kol. 2004: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. Svojtka & Co. Praha  
Výskyt v ČR: Hudec a kol. 2005: Fauna ČR, Ptáci 2/II. Academia Praha  
Stav a početnost v ČR: BirdLife International 2004: Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation Series No.12, Cambridge, UK