

# Určování v přírodě

Ilustrace: Jan HOŠEK

## Sýkora modřinka (*Cyanistes caeruleus*)

Velikost: 10,5–12 cm

Prostředí: listnaté a smíšené lesy, remízky, aleje, zahrady, parky ve městech

Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na celém území od nejnižších poloh až po hory, směrem do hor ubývá

Stav a početnost v ČR: naše druhá nejpočetnější sýkora, 0,8–1,6 mil. párů, stabilní stav

Juv.

modrá čepička

pruh přes oko

♀ = ♂

žlutá

letky a krovky modré

široký černý pruh

♂

černá čepička, bílé ohraničené líce

letky a krovky modrošedé

žlutá

♀ = ♂

tenký černý pruh

♀

Juv.

## Sýkora koňadra (*Parus major*)

Velikost: 13,5–15 cm

Prostředí: listnaté a smíšené lesy, zahrady, parky ve městech

Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na celém území od nejnižších poloh až po hory

Stav a početnost v ČR: nejrozšířenější a nejpočetnější druh sýkory u nás, 3–6 mil. párů, stabilní stav

bez pruhu, nahnědlé

♀ = ♂

jednotně šedavé

## Sýkora azurová (*Cyanistes cyaneus*)

Velikost: 12–13 cm

Prostředí: Listnaté lesy, porosty podél řek a mokřadů.

Výskyt v ČR: Zřídka se zatoulává na podzimním tahu a v zimě. Pochází ze střední Asie, obývá pás od východní Evropy po východní pobřeží Číny.

## Sýkora uhelníček (*Periparus ater*)

Velikost: 10–11,5 cm

Prostředí: zejména jehličnaté lesy, ve smíšených lesích vyhledává ostrůvky jehličnanů

Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na celém území od nejnižších poloh až po hory, v horách často nejpočetnější sýkora

Stav a početnost v ČR: mírný nárůst, 0,5–1,0 mil. párů

## Sýkora lužní (*Poecile montana*)

Velikost: 12 cm

Prostředí: v nížinách obvykle ve vlhkých lesích a v porostech podél řek, ve větších nadmořských výškách pak často v jehličnatých lesích

Výskyt v ČR: stálá, hnízdí pravidelně avšak ostrůvkovitě na většině našeho území

Stav a početnost v ČR: stabilní, 40–80 tis. párů

matně černá

obvykle rozsáhlejší skvrna

♀ = ♂

světlé pole

## Sýkora parukářka

(*Lophophanes cristatus*)

Velikost: 10,5–12,5 cm

Prostředí: jehličnaté lesy, hlavně borové, nebo smíšené lesy s převahou jehličnanů

Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí na celém území, avšak často v nízkých hustotách

Stav a početnost v ČR: stabilní, 80–160 tis. párů

chocholka

černý lem

♀ = ♂

♀ = ♂

bílá

Mlynařík dlouhoocasý  
severoevropský  
(*A. c. caudatus*)

♀ = ♂

dlouhý, štíhlý

## Sýkora babka (*Poecile palustris*)

Velikost: 12 cm

Prostředí: starší listnaté a smíšené lesy

Výskyt v ČR: stálá, pravidelně hnízdí, avšak místy chybí nebo je vzácnější

Stav a početnost v ČR: slabý pokles v 80. letech, nyní stabilní, 55–110 tis. párů

leskle černá

obvykle menší  
skvrna

dlouhý, štíhlý

## Mlynařík dlouhoocasý

(*Aegithalos caudatus*)

Velikost: 13–14 cm, z toho ocas až 9 cm

Prostředí: listnaté a smíšené lesy s bohatým podrostem, porosty podél vodních toků, zahrady a městské parky

Výskyt v ČR: stálý, pravidelně hnízdí zejména v nižších polohách

Stav a početnost v ČR: klesající, 45–90 tis. párů

černohnědý pruh

typické hnízdo  
mlynařika

♀ = ♂

### Literatura:

Svensson a kol. 2004: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu, *Svojtka & Co., Praha*

Šťastný K., Bejček V. a Hudec K. 2006:

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003, *Aventinum, Praha*

Mlynařík dlouhoocasý  
středoevropský  
(*A. c. europaeus*)