


# Určování v přírodě

Ilustrace: Jan HOŠEK



1. zima ①

1. zima ②

dosp. ③

dosp. ②

tmavý lem

bílý ocas

tmavý lem

bílý lem  
na ručních  
letkách

bílý ocas

tmavá spodina

tmavý lem

1. zima ③

dosp. ①

tmavé letky

bílý ocas

bílé letky

tmavý

světlé  
loketní  
krovky

1. zima ②

1. zima ①

tmavá skvrna

červený  
s tmavou  
špičkou

dosp. ④

červený  
s tmavou  
špičkou

dosp. ②

černý

dosp. ③

dosp. ①

## ① Racek chechtavý (*Larus ridibundus*)

Velikost: 35–39 cm  
Zimní výskyt v ČR: protahuje,  
zimuje 80–140 tisíc exemplářů

## ② Racek černohlavý (*Larus melanocephalus*)

Velikost: 37–40 cm  
Zimní výskyt v ČR: jednotlivě protahuje  
hlavně na jarním tahu


## ③ Racek malý (*Larus minutus*)

Velikost: 24–28 cm  
Zimní výskyt v ČR: pravidelně  
protahuje po desítkách až stovkách  
exemplářů, hlavně na jarním tahu

## ④ Racek bouřní (*Larus canus*)

Velikost: 40–46 cm  
Zimní výskyt v ČR: protahuje,  
zimuje 600–1300 exemplářů






1. zima ④

dosp. ④


1. zima ④



2. zima ⑤

dosp. ⑤

dosp. ⑥



1. zima ⑤



dosp. ⑤

dosp. ⑥

**Doporučená určovací literatura**

Beaman M., Madle S. 1998: The Handbook of Bird Identification for Europe and the Western Palearctic. A & C Black Publishers Ltd., London.  
 Cramp S. 1983: The Birds of the Western Palearctic, Volume 3. Oxford University Press.  
 Grant P. 1997: Gulls: A guide to Identification. Princeton University Press.  
 Harris A., Shirihai H., Christie D. 1996: The Macmillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds. Macmillan.  
 Olsen K. M., Larsson H. 2004: Gulls of Europe, Asia and North America. Helm's Identification Guides. A & C Black Publishers Ltd., London.  
 Svensson L., Grant P. J. 2004: Ptáci Evropy, Severní Afriky, Blízkého východu. Svojtka a Co, Praha.

**⑤ Racek bělohlavý/středomořský**  
 (*Larus cachinnans/michahelis*)

Velikost: 52–58 cm

Zimní výskyt v ČR: protahuje, zimují desítky exemplářů

**⑥ Racek žlutohý**  
 (*Larus fuscus*)

Velikost: 48–56 cm

Zimní výskyt v ČR: pravidelně jednotlivě protahuje