

Rákosník velký

(*Acrocephalus arundinaceus*)

Velikost: 16–20 cm

Prostředí: trvale zaplavené porosty rákosu a orobince

Výskyt v ČR:

tažný (IV.–V. a VIII.–IX.),
hnízdí řídké v nižších polohách;
pouze lokálně (jižní Morava,
Polabí) je hojnější

Stav a početnost v ČR:

mírný vzestup, 1 200–2 400 párů

Určování v přírodě

Ilustrace: Jan HOŠEK

Rákosník zpěvný

(*Acrocephalus palustris*)

Velikost: 13–15 cm

Prostředí: husté bylinné porosty podél
vodních toků, komunikací i na okrajích rybníků,
často i v ruderalní vegetaci na skládkách,
úhorech atp. Pravidelně i na okrajích
řepkových a obilných polí.

Výskyt v ČR: tažný (V. a VIII.), pravidelně hnízdí
na celém území, a to i ve vyšších polohách

Stav a početnost v ČR: stabilní, 80–160 tis. párů

Rákosník obecný

(*Acrocephalus scirpaceus*)

Velikost: 12,5–14 cm

Prostředí: především porosty rákosu
a orobince ve vodní i terestrické fázi

Výskyt v ČR: tažný (IV.–V. a VIII.–IX.),
pravidelně hnízdí v nižších a středních
polohách na celém území

Stav a početnost v ČR:

stabilní, 50–100 tis. párů

světle hnědý
s živě narezavělým
nádechem

malý přesah
ručních letek

tmavší

bělavé s nažloutlým
nádechem, ale s tmavšími
žlutohnědými boky

bělavé s nažloutlým
nádechem

světlejší

světle olivově
hnědý

velký přesah
ručních letek

šedobílý okraj
křídla

masově
růžové

rezavě žluté,
pouze náznak
světlejších
špiček

Cvrčilka slavíková

(*Locustella luscinioides*)

Velikost: 13,5–15 cm

Prostředí: větší zaplavené rákosiny nebo porosty
orobince, většinou s podrostem ostřice

Výskyt v ČR: tažná (IV. a VIII.–IX.)

Stav a početnost v ČR: mírný vzestup, 450–900 párů

Literatura: Balát F. 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. *Academia, Praha.*

➤ Hudec K. a kol. 1983: Fauna ČSSR, Ptáci 3/1, *Academia, Praha* ➤ Kennerley P.,

Pearson D. 2010: Reed and Bush Warblers. *Christopher Helm, London.* ➤ Svensson

L., Grant P. J. 2004: Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu, *Svojtka & Co.,*

Praha ➤ Štátný K., Bejček V. a Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků

v České republice 2001–2003, *Aventinum, Praha.*

Rákosník proužkovaný


(*Acrocephalus schoenobaenus*)

Velikost: 11,5–13 cm

Prostředí: okraje rákosin přecházející do vlhkých luk (ostřicové stoličky), často s roztroušenými keři

Výskyt v ČR: tažný (IV. a VIII.–IX.), pravidelně hnízdí, zejména v nižších polohách

Stav a početnost v ČR: kolísající, 40–80 tis. párů



Rákosník tamaryškový

(*Acrocephalus melanopogon*)

Velikost: 12–13,5 cm

Prostředí: rákosiny větších rybníků

Výskyt v ČR: vzácně za tahu a po vyhnízdění (III.–IV. a VII.–X.), především na jižní Moravě.

Velmi vzácný v hnízdni době (1 × pokus o zahnízdění).

Rákosník ostřicový

(*Acrocephalus paludicola*)

Velikost: 11,5–13 cm

Prostředí: většinou vlhké louky a okraje rákosin

Výskyt v ČR: tažný (IV.–V. a VIII.–IX.), nehnízdí, přes naše území pouze vzácně protahuje

Cvrčilka říční


(*Locustella fluviatilis*)

Velikost: 14,5–16 cm

Prostředí: okraje vlhkých listnatých lesů a louky zarůstající keři, též porosty křovin a vyšších bylin (často kopřivy) podél vodotečí, cest atd.

Výskyt v ČR: tažná (V. a VIII.), pravidelně hnízdí na celém území

Stav a početnost v ČR: stabilní, 10–20 tisíc párů



Cvrčilka zelená

(*Locustella naevia*)

Velikost: 12,5–13,5 cm

Prostředí: především vlhké louky s roztroušenými keři a okraje rákosin, řídčeji i sušší stanoviště (úhory, rumiště, paseky)

Výskyt v ČR: tažná (IV.–V. a VIII.–IX.), pravidelně hnízdí na celém území

Stav a početnost v ČR: stabilní, 18–36 tisíc párů