


Vrabci Evropy

Určování v přírodě

Ilustrace: Jan HOŠEK



Vrabc domácí

(*Passer domesticus*)

Velikost: 14–18 cm

Prostředí: lidská sídla

Výskyt v ČR: celoročně na celém území

Výskyt v Evropě: celé území
Stav a početnost v ČR: mírný pokles, 3–6 milionů párů

černé proužky

kaštanová
čepička

M v létě (F podobná
jako u v. domácího)

bílá tvář


černá kresba



posedává ve velkých
hejnech v keřích
a stromech

z dálky nápadná
černá kresba

černá náprsenka
převážně překryta
bílymi okraji per



šedé temeno

světle béžový
nadoční proužek

celkově šedohnědý
nenápadný vzhled

černý černá
náprsenka

kaštanově
hnědé
strany hlavy

šedé
tváře

kaštanová
čepička

M v létě

M v létě (F stejná
jako u v. domácího)



světlý
zobák

M v zimě

F

velká hlučná
hejna v keřích

z dálky celkově
šedý dojem

Vrabc italský

(*Passer italiae*)

Velikost: 15–16 cm

Prostředí: lidská sídla, otevřená krajina

Výskyt v Evropě: Itálie, Korsika, Sicílie, Malta, Kréta

Poznámka: hybridní druh vzniklý křížením vrabce
domácího a pokřovního

bílá tvář

černá svrna
na bradě

bílá tvář
s černou skvrnkou

bílý límeček

menší hejna i během hnízdění,
v zimě se sdružuje s ostatními
pěnkavovitými ptáky

z dálky nápadná kaštanová čepička
a černá skvrna na bílé tváři

Vrabc polní

(*Passer montanus*)

Velikost: 14 cm


Prostředí: zemědělská krajina, lidská sídla

Výskyt v ČR: celoročně na celém území

Výskyt v Evropě: celé území
kromě severní Skandinávie

Stav a početnost v ČR: mírný pokles,
400–800 tisíc párů

M, F v létě



M v létě (F matněji)

kontrastní kresba
v křídle a ocasu

zpívá v letu

M, F v zimě

světlý

černý

černá skvrna
na bradě překryta
světlými lemy per

mohutný zobák,
žlutá spodní čelist

M, F

žlutá skvrna na hrudi

Vrabec skalní

(*Petronia petronia*)

Velikost: 14–17 cm

Prostředí: otevřená krajina, skalní stěny, suché oblasti, lomy, vesnice

Výskyt v Evropě: Středomoří

světlý

M v zimě

hnědý
nádech

šedá hlava

černý

bílý vous

černá
brada

žlutobílý nadoční proužek

žlutá strana krku

žlutavý
nadoční
proužek

náznak žluté

Vrabec moabský

(*Passer moabiticus*)

Velikost: 11,5–13 cm

Prostředí: porosty tamaryšku a jiné křoviny, v blízkosti vodních toků a ploch

Výskyt v Evropě: Kypr

M v létě

F

kaštanové
pole v křídle

Literatura

Šťastný K., Bejček V. a Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003, *Aventinum Praha*

Clement P., Harris A. a Davis J. 1999: Finches and sparrows. Helm Identifications Guides. *Christopher Helm London*

Jednotný program sčítání ptáků; jpsp.birds.cz